



**129.** *Psammodromo mauretanicus* — *Psammodromus algericus*: a sinistra, maschio dell'Isolotto dei Conigli, Lampedusa, Isole Pelagie.

**130.** A destra: *psammodromo iberico* — *Psammodromus hispanicus*, maschio di Sète, Herault, Francia meridionale.

partimento di Gard tra Remoulins e Villeneuve), la Penisola Iberica (a eccezione della maggior parte dei Pirenei, della Sierra de la Demanda e dei M.ti Cantabrigi), l'Isola Medas lungo la Costa Brava, l'Isolotto dei Conigli vicino all'Isola di Lam-

pedusa e l'Africa nord-occidentale (Marocco, Algeria e Tunisia). La popolazione dell'Isolotto dei Conigli appartiene alla sottospecie nominale. In italiano questa specie è stata chiamata anche "lucertola striata comune".

## **Psammodromo iberico**

*Psammodromus hispanicus* Fitzinger, 1826

È simile alla specie precedente, dalla quale si riconosce per avere il collare distinto, le V delle due file mediane più strette di quelle laterali e le squame laterali del collo granulari o moderatamente carenate sino all'altezza della parte superiore del timpano; 9-15 pori femorali, 30-42 Sqd in linea trasversa a metà corpo. Il colore di fondo delle parti superiore è di regola bruno con numerose tassellature nere o nerastre disposte più o meno trasversalmente sul collo e sul dorso; quest'ultimo è solcato longitudinalmente da 4 fasce chiare: 2 sopraciliari e 2 laterooccipitali. Lt adulti 10-15 cm (♂ maggiore, ma nelle ♀♀ la

Ltt è di solito superiore: sino a 51 mm nelle ♀♀ e a 47 mm nei ♂♂) (fig. 130).

Abita la Francia meridionale (a est almeno sino a Roquebrune-sur-Argens nel Dipartimento di Var) e la Penisola Iberica (a eccezione dei Pirenei, dei M.ti Iberici settentrionali, della Tierra de Campos, dei M.ti Cantabrici e della Galizia).

Secondo più studiosi nella Spagna orientale (Murcia, Valenza, Aragona meridionale, Catalogna) e nella Francia sud-orientale vivrebbe la ssp. *edwardsianus* (Dugès, 1829).

In italiano questa specie è stata chiamata anche "lucertola striata spagnola".

## **Pseudopo**

*Ophisaurus apodus* (Pallas, 1775)

Muso aguzzo, capo angoloso, tronco robusto e rivestito da squame romboidali disposte in numero di 12-14 in linea trasversa a metà corpo, fianchi percorsi longitudinalmente da una profonda piega dermica. Negli adulti la colorazione delle parti superiori è di regola bruna e quella delle parti inferiori quasi sempre giallastra; nei subadulti e nei giovani le parti superiori sono grigie o brune e il dorso è solcato da fasce longitudinali bruno-scure che continuano talvolta oltre la metà della co-

da. Nei ♂♂ la lunghezza della coda è, rispetto a quella del corpo, relativamente più lunga di quella delle ♀♀. L'autotomia è meno frequente che nell'orbettino. Lt adulti 80-145 cm (♂ maggiore), ma la Ltt è in media leggermente superiore nelle ♀♀; p adulti sino a 200-455 g (fig. 131).

Abita la Jugoslavia costiera, subcostiera e limitatamente insulare, l'Albania occidentale, la Grecia (Epiro orientale, Tessaglia occidentale, Macedonia occidentale escluse) comprese