

**LACERTA MURALIS** *Lagartija roquera*

*Cat.:* Sargantana. *Vas.:* Sugandila. *Gall.:* Lagarto.

**Lám. 69**

**Identificación.** Adultos hasta 7,5 cm de hocico a cloaca; hasta 20 cm incluyendo la cola, pero normalmente más pequeños. Cuerpo bastante aplastado y cabeza alargada. Collar de borde recto formado por 9 a 11 escamas.

---

**Lámina 68**

*Lacerta monticola*. Lagartija serrana.

Extremidades bien desarrolladas. Dorso pardo o pardo grisáceo, frecuentemente con una línea formada por manchas oscuras, y costados más oscuros. El diseño suele ser más uniforme en la hembra que en el macho. Partes inferiores blanquecinas o rojizas —muy llamativas en los machos en celo—. Los machos son algo mayores que las hembras y tienen una serie de ocelos azules situados en las escamas ventrales externas.


**Especies parecidas.** *Lacerta monticola* (sp. anterior), *Lacerta hispanica* (pág. 102) y *Lacerta vivipara* (pág. 114).

**Hábitat.** Zonas soleadas en laderas, bordes de caminos, taludes y sobre todo en zonas cercanas a viviendas humanas.

**Biología.** Especie típicamente trepadora, muy ágil y activa. Tolera muy bien la presencia del hombre. A pesar de que una actividad continuada no la inicia hasta el mes de marzo, es frecuente encontrarla activa o tomando el sol en los días soleados del invierno. La puesta tiene lugar entre abril y junio —según las zonas— y está formada por un máximo de 9 huevos que entierra la hembra, frecuentemente debajo de un tronco o piedra con cierta humedad. Aproximadamente 2,5 meses dura la incubación, naciendo pasado este período las pequeñas lagartijas, que miden escasamente 7 cm de longitud total.

**Distribución.** Presente en el Sistema Central y franja norte de la Península. Mapa 37.





37. *Lacerta muralis*  
Lagartija roquera  
106, 69