

Agamidae.

***Agama bibroni* Duméril.**

Una ♀ de Bab-Taza (El Ajmas), 15 de junio; un ♂ de Puente Melha (Beni Ahmed), 15 de junio, y un ♂ de Targuist (Targuist), 24 de junio.

Lacertidae.

***Lacerta ocellata pater* Lataste.**

Un magnífico ejemplar ♂ adulto de Puente Melha (Beni Ahmed), 15 de junio; mide 164 mm. desde el hocico a la hendidura cloacal y 382 mm. de cola. Otro ejemplar de Tamorot (Beni Halet), 16 de junio; es un joven que mide 76 mm. del hocico al ano y 182 mm. de cola.

***Lacerta muralis bocagei* Seoane.**

Varios ejemplares de Telata (Ketama), 17 de junio; dos de Tizi Taka (Beni Seddat), 23 de junio; varios individuos de Imasinen (Beni Seddat), 20 de junio; dos de Targuist (Targuist), 24 de junio; uno de Iguermalen, 25 de junio.

Lacerta muralis bocagei Seoane, es abundantísima en todas las comarcas que recorrimos. Uno de los ejemplares de Tizi Taka presenta la última porción de la cola bifurcada en el plano sagital.

***Acanthodactylus vulgaris* Duméril et Bibron.**

Un ♂ de Tainsa (Ketama), 18 de junio; una ♀ y un individuo de Targuist (Targuist), 24 de junio; un individuo joven de Beni Ammart (Beni Ammart), 25 de junio; un ♂ y un joven de Villa Sanjurjo (Bokoia), 26 de junio, y un ♂ y una ♀ de Mar Chica (Melilla), 29 de junio.

***Psammodromus algirus* Linné.**

Dos ♀ ♀ de Telata (Ketama), 17 de junio, y otra ♀ de Imasinen, 20 de junio.

***Psammodromus algirus ketamensis* nov. var.**

Tipo: ♂, Telata de Ketama (Marruecos), en Museo de Madrid; alotipo: ♀ para- y topotípica, en la misma colección.

Establezco esta variedad sobre diez ejemplares pertenecientes al Museo de Madrid, de las siguientes localidades: una ♀ de Yebel Magot (El Ajmas), 14 de junio; tres ♂ ♂ de Telata (Ketama), 17 de junio;

2 ♀♀ de Telata (Ketama), 17 de junio; un ♂ de Tizi Taka (Beni Seddat), 23 de junio; un ♂ de Imasinen (Beni Seddat), 20 de junio, y dos ♂♂ de Targuist (Targuist), 24 de Junio.

Concuerdan todos estos ejemplares con la forma tipo ¹ en cuanto a los caracteres morfológicos, pero difieren ostensiblemente en la coloración, y en ella baso esta variedad, pues esas diferencias, que son constantes y absolutamente definidas, comunican a los individuos que las presentan un aspecto claramente distinto, permitiendo distinguirlos desde el primer momento, sin titubeos y a golpe de vista, de la forma típica, con la que convive.

Tipo ♂.—Coloración del dorso pardo-olivácea uniforme, pardo-grisácea en la cola. Sin la menor traza de línea alguna. En los flancos esta coloración se hace más verdosa, aun azulada. La cabeza parda, excepto los prefrontales y las regiones frenal, superorbital y temporal, que son de un rojo-anaranjado intenso en el vivo ², quedando los labiales completamente limpios. La región gular presenta un tinte ligeramente azulado y la zona que correspondería al collar de otros géneros teñida débilmente de amarillo-verdoso.

Tanto la cabeza como el cuello son algo más anchos que en la ♀. Mide 90 mm. desde el hocico a la hendidura cloacal y 155 mm. de cola.

Alotipo ♀.—La coloración dorsal pardo-olivácea uniforme se extiende hasta la misma cabeza, que carece de la hermosa coloración que ostenta la del ♂. Los flancos son más verdosos y la cola más parda que el dorso. Las partes ventrales blancas, careciendo también de las tintas azuladas y amarillentas que el ♂ posee en la región gular.

Mide 80 mm. desde el hocico a la hendidura cloacal y 180 mm. de cola.

Doumergue ³, después de describir la coloración de esta especie, hace la siguiente «Observation: M. Vaucher m'a envoyé de Tanger un jeune algire à coloration du dos d'un brun olivâtre uniforme sans aucune trace de bandes». Trátase muy probablemente de un individuo perteneciente a la variedad que acabo de describir.

¹ Boulenger (G. A.): *Monograph of the Lacertidae*, vol. II. London, 1921.

² Bajo la acción del alcohol se decolora muchísimo y aun puede llegar a decolorarse completamente.

³ Doumergue (F.): «Essai sur la faune erpétologique de l'Oranie avec de tableaux analytiques et des notions pour la détermination de tous les reptiles et batraciens du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie». *Bull. de la Soc. Géogr. et de Arch. d'Oran*, XIX-XXI, 1901, y tirada aparte, Oran, L. Fouque, I vol. 8.º, 404 págs. y 27 pl.