



Veldwaarnemingen in de omgeving van Roosendaal

JAN
VAN OOSTEN
BART
SIEBELINK
p/a Parklaan 5
4702 XA
Roosendaal


INLEIDING

In de afgelopen jaren hebben we vrij veel amfibieën en reptielen waargenomen. Goede vindplaatsen waren de heide in Wuustwezel (België) en een poel in de buurt van Wouw.

WUUSTWEZEL

Naar aanleiding van een krantartikel "Adders in Wuustwezel" gingen we er een kijkje nemen. Aan de kant van de weg Breda - Antwerpen lag een dennenbos waarin we tientallen Bruine kikkertjes vonden (*Rana temporaria*). Achter dit bos bevond zich een uitgestrekte heide met daarin een grote waterplas, die waarschijnlijk ontstaan is door afgraving. Hierin werden honderden Groene kikkers (*Rana esculenta*) waargenomen, die zich ophielden in de waterplanten (Pijlkruid) aan de randen. Later werden er ook verscheidene *Triturus helveticus* (Vinpootsalamander) in gezien. Op de heide zelf wemelde het van de waterjuffers. Ook levendbarende hagedissen (*Lacerta vivipara*) waren er zeer algemeen. Deze soort komt trouwens ook op de Kalmt-houtse hei voor.

Lacerta vivipara.
Foto:
LANGERWERF.



Als leukste vondst vermelden we een volwassen mannetje *Vipera berus*. We konden hem gemakkelijk vangen door er voorzichtig op te gaan staan. Aldus konden we de Adder 'vastleggen' en vervolgens met een stok verder manoevreren. Deze Adder was nogal bijzonder: de grondkleur was grijsgroen, de zigzag-streep was midden op het lijf een bruin-grijze rechte streep met donkerder vlekken aan de randen. De supralabialen waren geel evenals de onderkant van de staart. Later werd nog een kleinere, bruine adder waargenomen (♀).

DE BRANDPUT

Op ± één kilometer afstand van Wouw ligt een brandkuil. Hierin komen *Triturus alpestris* (Alpenwatersalamander) en *Triturus vulgaris* (Kleine watersalamander) voor. We zagen dat *T. alpestris* al begin maart 1981 actief was. Omdat we sinds die keer geen *T. alpestris* meer gezien hebben, maar in vergelijking met voorgaande jaren steeds meer *T. vulgaris* waargenomen hebben, zijn we bang dat *T. alpestris* wordt verdrongen. In juli/augustus vonden we redelijke aantallen larven van *T. vulgaris*. Opvallend was het feit dat de salamanders zich altijd in de hoek bevonden waar de wind vandaan kwam. Een beschutte hoek dus. Deze poel was ook de voortplantingsplaats van *Bufo bufo*. In de rest van west-Brabant werd *Bufo bufo* verspreid in kleine kolonies aangetroffen. *B. calamita* (Rugstreeppad) is alleen op Tholen gevonden. Het is wellicht nuttig om te vermelden dat hun aantal achteruit gaat. Alleen *Rana temporaria* is zeer algemeen in West-Brabant. Dit is de enige soort waarover we ons hier (voorlopig althans) geen zorgen hoeven te maken.