

LEZARD VERT

Lacerta viridis Laurenti



Lacerta viridis, mâle, Port-Lesney.



Accouplement, Berry. Le mâle saisit l'arrière-corps de la femelle entre ses mâchoires.

Y. Lanceau

R. Guyétant



Détail de la tête, mâle.

G. Naulleau

RÉPARTITION.

Carte n° 4

TAILLE.

35 cm dont 16 à 23 cm pour la queue. Peut atteindre 40 cm.

COLORATION.

Assez variable. Dos vert vif ou brun avec deux bandes longitudinales blanchâtres ou piqueté de noir et jaune. Le ventre est jaune uniforme ou jaune verdâtre. Les jeunes ont le dos brunâtre avec une ligne dorso-latérale jaune ou blanche et le ventre blanc. Des cas de mélanisme et d'albinisme partiels ont été signalés.

BIOTOPE.

Bordure des bois ou boqueteaux, au pied des buissons, parmi les herbes, sur les talus, dans les champs. Affectionne les terrains accidentés secs et ensoleillés.

COMPORTEMENT.

Actif le jour, s'étend au soleil, mais s'abrite par les temps chauds. Il se déplace très vite. Il est bon grimpeur et nageur. Mord fortement quand on le saisit, mais n'est pas dangereux.

HIVERNAGE.

De novembre à février ou mars, dans des trous, des amas de végétation ou sous des racines.

NOURRITURE.

Insectes, Araignées, Crustacés, Vers, Mollusques, petits Lézards, parfois même de sa propre espèce, œufs d'Oiseaux et occasionnellement micro-Mammifères. Peut manger des fruits juteux.

REPRODUCTION.

Accouplement au printemps ; ponte, un mois après (en mai ou juin), de 5 à 20 œufs blanchâtres de 15 à 20 mm de long et 8 à 11 mm de large. Ces œufs sont déposés dans un trou peu profond creusé par la femelle dans un sol meuble. Il peut y avoir une deuxième période d'accouplement suivie de ponte fin juin, début juillet. L'incubation dure 2 à 3 mois et demi. Les jeunes mesurent 4 à 5 cm. Des cas d'hermaphrodisme ont été signalés.



Carte 4. *Lacerta viridis*.