

# LEZARD VIVIPARE

*Lacerta vivipara* Jacquin



*Lacerta vivipara*, femelle en mue avant la mise-bas.

Y. Lanceau

## RÉPARTITION.

Carte n° 6. A part la Provence et la bordure côtière au sud de la Loire, il est présent presque partout en France, bien que plus ou moins localisé.

## TAILLE.

16 à 18 cm dont 10 à 11 cm de queue.

## COLORATION.

Dos brun, noirâtre, gris, rougeâtre ou jaunâtre avec souvent une ligne vertébrale sombre et des rangées longitudinales de petites taches claires. Ventre orange ou rouge vermillon taché de noir chez le mâle ; jaune ou orange clair uniforme ou à peine taché de noir chez la femelle. Les jeunes sont noirâtres avec le ventre gris foncé. Il existe des cas de mélanisme chez cette espèce. Nous avons eu la chance de pouvoir en observer un exemplaire.

## BIOTOPE.

Aime vivre dans les endroits humides. Il fréquente la bordure des bois, les prairies, les landes, les marécages, les tourbières, les rochers et les dunes au bord de la mer. Atteint 3 000 m dans les Alpes. On le rencontre souvent dans les mêmes biotopes que la Vipère berus (*Vipera berus* L.) qui s'en nourrit volontiers.

## COMPORTEMENT.

Actif le jour et fort habile, ne craint pas de chercher refuge dans l'eau. Se chauffe au soleil sur les pierres, écorces et mousses.

## HIVERNAGE.

D'octobre à février ou mars. Il peut réapparaître l'hiver par belles journées ensoleillées.

## NOURRITURE.

Insectes et leurs larves, Araignées, Cloportes, Mollusques et Vers.

## REPRODUCTION.

Accouplement en avril ou mai. C'est le seul Lacertidé ovovivipare, c'est-à-dire que les œufs sont incubés dans le corps de la femelle. Après une « gestation » de 3 mois, la femelle donne naissance à 5 - 10 petits de 3 à 4 cm qui sortent de l'œuf lors de la ponte ou peu de temps après.



Forme mélanique, mâle, Coudré, Grandvillard (Suisse). G. Naulleau



Carte 6. *Lacerta vivipara*.