

Lagartija de Marruecos

(*Lacerta perspicillata*)




L

AGARTIJA DE MARRUECOS


Lacerta perspicillata Duméril & Bibron 1839

Identificación


Lagartija pequeña. Generalmente con diseño oscuro reticulado en el dorso y costados.




Con ventana transparente en el párpado inferior. Dos postnasales superpuestas. Escamas temporales pequeñas. Timpánica presente. Sin masetérica. Con 5-9 supratemporales de tamaño descendiente hacia atrás. Cinco supralabiales anteriores a la subocular.



Escamas normales.
Pigmentación variable.



Collar liso.
Sin pigmentación oscura.



Ventrales dispuestas en 10-12 series longitudinales rectas. Pigmentación oscura muy escasa en las ventrales externas.

MAPA DE DISTRIBUCIÓN



Distribución y abundancia

Especie nativa de Marruecos y Argelia, está introducida en Menorca.

Tamaño

En Menorca los machos alcanzan 55,5 mm y las hembras 52 mm. La longitud de cabeza y cuerpo puede alcanzar 61 mm. La longitud de la cola alcanza 100 mm.

Descripción

Cabeza y cuerpo comprimidos dorsoventralmente. Posee dos post-nasales superpuestas. Tiene 5 a 7 supraciliares. Disco transparente

Lagartija de Marruecos, *Lacerta perspicillata*, Cala'n Blanes, Menorca.





Lagartija de Marruecos, *Lacerta perspicillata*. Puerto de Ciutadella, Menorca.

amplio, ocupa gran parte del párpado inferior. Escama timpánica presente. Tiene 28 a 36 escamas gulares contadas en una línea entre la unión de submaxilares y la escama central del collar. Pliegue gular manifiesto. Collar liso, con 5 a 12 escamas. Escamas dorsales pequeñas, granulares, poco aquilladas, en número de 50-66 en el centro del cuerpo. Ventrals dispuestas en 10- 12 series longitudinales y 29 a 36 transversales. Posee 16 a 21 poros femorales y 22 a 26 laminillas subdigitales. Dorso gris, pardo u oliváceo, con retículo de manchas negras y ocelos blancos o amarillentos. Jóvenes con cola azul.

Variación

El diseño varía individualmente. Hay individuos con dorso y costados reticulados, mientras que otros carecen de diseño por completo. Las poblaciones de Menorca pertenecen a la subespecie típica (*L. p. perspicillata*), que se encuentra en el noroeste de Argelia y nordeste de Marruecos. Otras dos subespecies (*L. p. pellegrini* y *L. p. chabanaudi*) se encuentran en el Atlas y noroeste de Marruecos. Algunos autores incluyen esta especie en los géneros *Scelarcis*, *Teira* o *Podarcis*.

Historia natural

En Menorca se encuentra en áreas rocosas, borde de acantilados marinos, vallas de piedra, bordes de matorral y de pinares. Alcanza 100 m de altitud. Se alimenta de insectos y frutos.

No se conoce su biología en Menorca. En el norte de Africa pone 1-4 huevos que miden 15 x 6 mm. Los recién nacidos miden 23 mm de longitud de cabeza y cuerpo y 34 mm de cola.

Bibliografía

Bons (1968), Bons y Geniez (1996), Esteban *et al.* (1994), Hicks (1992), Mateo (1997b), Mateo y Cano (1991), Mertens (1929^a), Pérez-Mellado (1998g), Richter (1980, 1986b), Schleich *et al.* (1996).