

LUCERTOLA CAMPESTRE

Podarcis sicula Rafinesque Schmaltz 1810

ORDINE **SQUAMATA**

SOTTORDINE **SAURIA**

FAMIGLIA **LACERTIDAE**

GEONEMIA: Entità circumtirrenico-appenninico-dinarica, diffusa nell'Italia continentale, peninsulare ed insulare, in Sicilia, Sardegna, Istria e nella Penisola Balcanica nord-occidentale; introdotta ed acclimatata in Spagna, nelle Baleari e negli USA.

CARATTERI DISTINTIVI: Colorazione del dorso verde con bande temporali longitudinali scure. Banda occipitale costituita da macchie nere; strie sopracciliari di regola continue interrotte alle squame sopratemporali, tavola proseguenti fino all'occhio, ma sfumate. Generalmente sono presenti due o più macchie azzurre all'attaccatura delle zampe anteriori. Gola e parti ventrali di regola chiare e immacolate. Maschi con livrea generalmente più brillante e marcata, di maggiori dimensioni e con pori femorali evidenti. Squame ventrali di forma subrettangolare. Lunghezza totale massima 26 cm.

HABITAT: Margini di boschi, boscaglie, radure e prati, coltivi, aree urbane, pietraie, cataste di legna, pinete litoranee, litorali sabbiosi, dune con vegetazione scarsa, alvei di torrenti e fiumi, sponde di laghi e stagni.

BIOLOGIA: Preda essenzialmente Insetti ed altri invertebrati terrestri. Spesso convive con *Podarcis muralis* dimostrandosi più competitiva nella ricerca del cibo. Le femmine depongono fino a 9 uova in buche scavate dalle stesse con le zampe anteriori alla base di cespugli. E' predata da vari serpenti, mammiferi e uccelli.

NOTE TASSONOMICHE: Specie politipica, per l'Italia sono descritte varie sottospecie. In regione è rappresentata dalla ssp. *campestris* (De Betta 1857) diffusa nell'Italia settentrionale e centrale.

DISTRIBUZIONE REGIONALE: Ampiamente distribuita in pianura e nella fascia collinare probabilmente con maggiore frequenza di quanto non appaia dalla mappa.



Foto G. Stagni

