

**ÜBERSICHT DER ARTEN UND
UNTERARTEN DER
FAMILIE LACERTIDAE**

1. Nachtrag

WOLFGANG BISCHOFF

Mit diesem ersten Nachtrag soll die Übersicht über die Lacerti-
den-Arten und -Unterarten fortgesetzt und auf den neuesten Stand
gebracht werden, wie ich es im letzten Teil der Übersicht angekün-
digt habe (BISCHOFF 1992). So muß die Liste der Gattung *Eremias*
(BISCHOFF 1991a) um die zwei neuen Taxa *E. afghanistanica* und *E.*
multiocellata szczerbaki (vgl. BÖHME & SCHTSCHERBAK 1991, JERIOM-
TSCHENKO, PANFILOW & ZARINENKO 1992) und die revalidierte Unterart
E. multiocellata stummeri (vgl. JERIOMTSCHENKO, PANFILOW & ZARINEN-
KO l.c.) ergänzt werden. Drei weitere Taxa erweitern die Gattung
Lacerta. Neubeschreibungen sind die Unterarten *L. rudis chechenica*
und *L. valentini spitzenbergerae* (vgl. EISELT & DAREWSKIJ 1991,
EISELT, DAREWSKIJ & SCHMIDTLER 1992), wobei *L. r. chechenica* der
bei BISCHOFF (1991b: 11) erwähnten *L. rudis* ssp. entspricht. Bei
L. lepida iberica handelt es sich wieder um ein revalidiertes Sy-
nonym (vgl. MATEO & CASTROVIEJO 1991).

***Eremias* WIEGMANN, 1834 [Wüstenrenner]**

(*Eremias* s.str.)

E. afghanistanica BÖHME & SCHTSCHERBAK, 1991

Afghanistan (Südost-Abfall des Hindukusch).

(*Pareremias* SCHTSCHERBAK, 1973)

E. multiocellata stummeri WETTSTEIN, 1940

Kirgistan (Issyk-Kul-Gebiet), Kasachstan (Naryn-Steppe) und
angrenzendes Gebiet von China.

E. multiocellata szczerbaki JERIOIMTSCHENKO, PANFILOW & ZARINENKO,
1992

Kirgistan (Tal des Flusses Arpa).

Lacerta LINNAEUS, 1758 [Halsbandeidechsen]

(*Apathya* s.l.) [Felseidechsen]

L. rudis chechenica EISELT & DAREWSKIJ, 1991

Russland, Nordabfall des zentralen Kaukasus (Tschetscheno-
Ingusetien und Daghestan), Georgien, Südabfall des zentra-
len Kaukasus.

L. valentini spitzenbergerae EISELT, DAREWSKIJ & SCHMIDTLER, 1992
Südöstlichste Türkei: Cilo-Sat Gebirge im Vilayet Hakkâri.

(*Timon* TSCHUDI, 1836) [Perleidechsen]

L. lepida iberica LÓPEZ SEOANE, 1884

NW-Spanien und NW-Portugal.

Literatur

- BISCHOFF, W. (1991a): Übersicht der Arten und Unterarten der Familie Lacertidae 2. Die Gattungen *Eremias*, *Gal-
lotia*, *Gastropholis*, *Heliobolus*, *Holaspis* und *Ichnotropis*. - DIE EIDECHSE, Bonn/Bremen, 2: 14-21.
-- (1991b): Übersicht der Arten und Unterarten der Familie Lacertidae 3. Die Gattung *Lacerta*. - DIE EIDECHSE,
Bonn/Bremen, 3: 5-16.
-- (1992): Übersicht der Arten und Unterarten der Familie Lacertidae 6. Die Gattungen *Poromera*, *Psammodromus*,
Pseuderemias, *Takydromus* und *Tropidosaura*. - DIE EIDECHSE, Bonn/Bremen, 6: 13-17.
BÖHME, W. & N.N. SCHTSCHERBAK (1991): Ein neuer Wüstenrenner aus dem Hochland Afghanistans, *Eremias* (*Eremias*)
afghanistanica sp.n. (Reptilia: Sauria: Lacertidae). - Bonn.zool.Beitr., 42(2): 137-141.
EISELT, J. & I.S. DAREWSKIJ (1991): *Lacerta rudis chechenica* ssp.n. aus dem Kaukasus (Reptilia: Lacertidae). -
Ann.Naturhist.Mus.Wien, 92(B): 15-29.
EISELT, J., I.S. DAREWSKIJ & J.F. SCHMIDTLER (1992): Untersuchungen an Felseidechsen (*Lacerta saxicola*-Komplex;
Reptilia: Lacertidae) in der östlichen Türkei. 1. *Lacerta valentini* BOETTGER. - Ann.Naturhist.Mus.Wien, 93(B):
1-18.
JERIOIMTSCHENKO, W.K., A.M. PANFILOW & E.I. ZARINENKO (1992): Konspekt issledowanii po zitogenetike i sistematike
nekotorych asiatskich widow Scincidae i Lacertidae. - Bischkek (ILIM), 182 S.
MATEO, J.A. & J. CASTROVIEJO (1991): Variation morphologique et révision taxonomique de l'espèce *Lacerta lepida*
DAUDIN, 1802 (Sauria, Lacertidae). - Bull.Mus.natn.Hist.nat., Paris, 4^e sér., 12, 1990 (1991), section A, n^{os}
3-4: 691-706.

Verfasser: WOLFGANG BISCHOFF, Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig, Adenauerallee 150-
164, D-53113 Bonn.