

P. S. Pallas,

D. A. D. Professors der Naturgeschichte und ordentlichen Mitglieds der Russisch-Kaiserlichen Academie der Wissensch. der freyen Oeconomischen Gesellschaft in St. Petersburg, wie auch der Römisch-Kaiserlichen Academie der Naturforscher, und Königl. Englischen Societät

Reise

durch

verschiedene Provinzen

des

Russischen Reichs

in einem ausführlichen Auszuge.



Zweiter Theil

- vom Jahr 1770 — 1771.
mit 22 Kupfern.

Frankfurt und Leipzig,
bey Johann Georg Fleischer,

1777.

Corpus crassitie digiti supra aterrimum, opacum, subtus politum, lactevm. *Scuta* abdominalia 153. *Squamae* sub cauda 31. parium.

Habitat in sylvis Sibiriae montanae, etiam borealioribus, minori gradu virulentus.

38. COLUBER *Dione*.

Corpus gracile, tripedale, cauda fere sextam longitudinis partem explente. *Tela* nulla, pecten palati quadruplex. *Caput* paruum, tetragonum, futuris plerumque fuscis reticulatum. *Color* supra amoene cinereus, imo saepe exalbidus, strigis tribus longitudinalibus candidioribus, inter quas dispositae liturae alternae fuscae, vel fusco reticulatae, saepe subconfluentes; subtus color albidus, lituris minutis livido-fuscis, atomisque saepe rubicundis adpersus. *Scuta* 190-206. *Squamae* in cauda 66-58. parium.

Elegantissima & innocua species in desertis salis versus mare Caspium, iterumque in aridis, salis, montosis ad Irin observata.

39. ANGVIS *miliaris*.

Grassities digiti minimi, longitudo tantum 14 uncia-
rum, quarum duae in caudam absumtae. *Forma* Scytales.
Caput gryseum nigro adpersum. *Cauda* corpore paulo
tenuior, cylindrica, obrusa, tota albo variegata. *Corpus*
atrum, latera squamulis discoloribus seu punctis creber-
rimis pallidis, ad dorsum gryseis conspersa. *Squamae* in
corpore subtus 170. subcaudales 32.

Habitat versus mare Caspium.

40. LACERTA *arguta*.

L. agili brevior, ventricosior, rostro acutiore. *Col-
lare* squamis obsoletis, aut plica sub collo duplex, insigni-
nis; Callosa puncta in femoribus obsoleta, pauciora. *Cau-
da* longe brevior, basi crassiuscula, subito adtenuata, ex-
tremo filiformi. *Color* subtus albus, supraglaucus, fasciis
crebris

crebris transversis nigris, in corpore saepe subconfluentibus, per caudae basin semper distinctissimis, quarum singula continet puncta ocellaria quaterna, quinae, dorsi colore.

Habitas in aridis, glareosis, apricis ad Irin australiorem, rarius circa M. Caspium, inque deserto arenoso finitimo.

41. SCARABEVS *albus*.

Magnitudo media inter Fullonem & Melolontham; *Forma* omnino prioris, nisi oblongior. *Antennae* masculis itidem lamellis septenis maximis. *Corpus* totum, thorax, elytra, pedes squamulis minimis albis farinosum atque candidum, quibus detritis apparet color piceus vel subtestaceus. Albissimum praesertim abdomen, Thorax, femoraque priora albo-lanata.

Noctiuagus, post medium Iunii apparet in arenosis Elymo abundantibus ad Irin & Iaikum, in australioribus.

42. SCARABEVS *Spireae*.

Inter Sc. arboreos minimus, vix Chysomelam medio-crem aequans, forma Horticolae. *Corpus* & thorax nigra, cano-pubescentia; *Elytra* grysea, sutura & margine fusca, tenerime pubescentia, abdomine paulo breviora. *Pedes* picei.

Apparet Maio, Iunioque in floribus variis, praesertim spirea crenata, rarior ad Volgam, in Sibiria campestri frequens.

43. TENEBRIO *leucogrammus*.

Apterus, ater, nitidulus, ovatus subtus gibbus, forma & magnitudine T. muricato simillimus. *Clypeus* punctis prominulis scaberrimus, margine laterali deflexo. *Elytra* coalita, utrinque latere carinata, strigis singula quinque laevigatis, usque ad basin vel extremitate tantum albo polline vel tomento incrustatis, quarum intervalia s. porci, punctis prominulis exasperantur. *Tibiae* anticae

(b) 3 latius.